

Заметка Келдиша

Теорема. Если граница Γ области D удовлетворяет условию

$$|\theta(s_1) - \theta(s_2)| < K(s_1 - s_2)^\lambda,$$

то полиномы Бибербаха удовлетворяют неравенству

$$|f(z) - \Pi_n(z)| < \frac{C(\varepsilon)}{n^{\lambda-\varepsilon}}.$$

Доказательство Производная $f'(z)$ удовлетворяет условию

$$|f'(z_1) - f'(z_2)| < M|z_1 - z_2|^\lambda,$$

поэтому можно построить $P_n(z)$ так, что


$$|f'(z) - P'_n(z)| < \frac{C_3}{n^{\lambda-\eta}}, \quad P_n(0) = 0, \quad P'_n(0) = 1,$$

$$|f(z) - P_n(z)| < \frac{C_3}{n^{\lambda-\eta}}.$$

Полагая $\pi_n(z) = P_n(z) - \Pi_n(z)$, получим

$$J_n = \iint_D |\pi'_n(z)|^2 d\sigma < \frac{2S C_3^2}{n^{2(\lambda-\eta)}}.$$

Пусть z_0 – точка границы. Впишем в область параболу $y = k_1|x|^{1+\lambda}$.



r_1 и δ_1 связаны соотношением

$$\delta_1 \sim (Cr_1)^{\frac{1+\lambda}{1-\lambda}},$$

кроме того,

$$r_2 \sim \delta_1,$$

$$r_{m+1} \sim \left[C^{\frac{(1+\lambda)^2}{2\lambda(1-\lambda)}} r_1 \right]^{\left(\frac{1+\lambda}{1-\lambda}\right)^m} \cdot C^{\frac{1+\lambda}{2\lambda}}.$$

Точку z_1 берем так, чтобы

$$q = C^{\frac{(1+\lambda)^2}{2\lambda(1-\lambda)}} r_1 < 1.$$

Выбирая m точек z_1, z_2, \dots, z_m , имеем

$$\begin{aligned} |\pi_n(z_k)| &\leq \pi_n(z_{k-1}) + \sqrt{\log(en) \frac{1}{\pi} \iint_{|z-z_{k-1}| \leq r_{k-1}} |\pi'_n(z)|^2 d\sigma} \\ |\pi_n(z_{m+1})| &\leq \pi_n(z_1) + \sqrt{\log(en)} \sum \left(\frac{1}{\pi} \iint_{|z-z_{k-1}| \leq r_{k-1}} |\pi'_n(z)|^2 d\sigma \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \pi_n(z_1) + \sqrt{\log(en) \cdot m \cdot \frac{2}{\pi} J_n} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} |\pi_n(z_0)| &\leq |\pi_n(z_{m+1})| + a_1 \rho + \dots + a_n \rho^n \leq \\ &\leq |\pi_n(z_{m+1})| + \left[\sum \frac{1}{k} \left(\frac{\rho}{r_{m+1}} \right)^{2k} \cdot \frac{1}{\pi} \iint_{|z-z_{m-1}| \leq r_{m-1}} |\pi'_n(z)|^2 d\sigma \right]^{\frac{1}{2}} \leq \\ &\leq |\pi_n(z_{m+1})| + \sqrt{\frac{1}{\pi} J_n \log(en)} \left(\frac{\rho}{r_{m+1}} \right)^n. \end{aligned} \quad (2)$$

$$\rho \sim r_{m+1} + \delta_{m+1},$$

$$\frac{\rho}{r_{m+1}} \sim 1 + C^{\frac{1+\lambda}{1-\lambda}} r_{m+1}^{\frac{2\lambda}{1-\lambda}}.$$

Соединяя (1) и (2), получаем

$$\begin{aligned} |\pi_n(z_0)| &\leq |\pi_n(z_1)| + \sqrt{\frac{2}{\pi} J_n \log(en)} \left\{ \sqrt{m} + \left(1 + C^{\frac{1+\lambda}{1-\lambda}} r_{m+1}^{\frac{2\lambda}{1-\lambda}} \right)^n \right\} \sim \\ &\sim |\pi_n(z_1)| + \sqrt{\frac{2}{\pi} J_n \log(en)} \left\{ \sqrt{m} + \left(1 + C^{\frac{(1+\lambda)^2}{2\lambda(1-\lambda)}} q^{\left(\frac{1+\lambda}{1-\lambda}\right)m} \right)^n \right\} \end{aligned}$$

Полагая, например,

$$m = 2 \frac{\log \log n}{\log \frac{1+\lambda}{1-\lambda}},$$

получим

$$|\pi_n(z_0)| \leq |\pi_n(z_1)| + \sqrt{\frac{4}{\pi} \log \frac{1+\lambda}{1-\lambda} J_n \log(en) \cdot \log \log n}.$$

Имея ввиду оценку для J_n , получим

$$|\pi_m(z)| < \frac{C}{n^{\lambda-\eta}},$$

что доказывает теорему.